200mm

187mm

Dow AgroSciences

AZ* 500

HERBICIDE

HERBICIDE ANTIDICOTYLÉES DE PRÉÉMERGENCE OU DE POSTÉMERGENCE PRÉCOCE EN CÉRÉALES D'HIVER (FROMENT, ESCOURGEON, TRITICALE, ÉPEAUTRE), EN PRAIRIE, GRAMINÉES, EN ARBRES ET ARBUSTES ORNEMENTAUX, EN VERGER DE POMMIER & POIRIER, EN FRAISIER & EN BULBES, TUBERCULES OU RHIZOMES DE PLANTES ORNEMENTALES. HERBICIDE DE POSTÉMERGENCE EN CHICORÉE, ENDIVE, VALÉRIANE, OIGNON, ÉCHALOTE, RHUBARBE.

HERBICIDE TEGEN DICOTYLEN IN WINTERGRANEN, TOE TE PASSEN IN VOOROPKOMST OF IN WINTERGRANEN (TARWE, GERST, SPELT, TRITICALE), IN WEILANDEN, GAZON, GRASVELDEN, IN SIERBOMEN EN -HEESTERS, IN BOOMGAARDEN (APPEL- & PERELAARS), IN AARDBEI, IN BOLLEN, KNOLLEN OF RHIZOMEN VAN SIERPLANTEN. HERBICIDE IN CICHOREI, WITLOOFWORTELTEELT, VALERIAAN, UIEN, SJALOT, RABARBER, TOE TE PASSEN IN NAOPKOMST.

CRAINT LE GEL / SECOUER AVANT L'EMPLOI
VORSTVRIJ BEWAREN / SCHUDDEN VOOR GEBRUIK

Contient : SC-suspension concentrée à base de 500 g/L d'isoxaben ou 45,4%
Bevat : SC-suspensieconcentraat op basis van 500 g/L isoxaben of 45,4%
Numéro d'agréation/Erkenningsnummer : 7573/B
Numéro d'agrément : L 1149-66
N° de lot : voir sur le flacon
Partijnummer : zie op de bus
*AZ trademark of Dow AgroSciences LLC

NATURE DES RISQUES PARTICULIERS

R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R53 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

GARANTIE

Le fabricant n'est pas responsable des risques de stockage, de la manipulation ou de l'efficacité de AZ* puisqu'il n'a aucun contrôle sur ceux-ci. Le fabricant garantit exclusivement la composition et le contrôle de qualité du produit qui est légalement autorisé à la vente et qui correspond à la formule mentionnée sur l' étiquette.

CENTRE ANTIPOISONS : 070/245.245.

irritant/irriterend

Volg de bijgevoegde gebruiksaanwijzing om gevaar aan mens en dier te voorkomen.
Respecter les instructions d'utilisation, ci-jointes, pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.

AARD VAN DE BIJZONDERE GEVAREN

R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R53 Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

WAARBORG

De fabrikant is niet aansprakelijk voor risico's die voortvloeien uit het opslaan, gebruik en verwerken van AZ*, aangezien deze buiten zijn controle liggen. De fabrikant garandeert uitsluitend de samenstelling en de kwaliteit van het product dat wettelijk is toegelaten en overeenstemt met de formulering vermeld op het etiket.

ANTIGIFCENTRUM : 070/245.245.

0,5 L ℮ PET

Dow AgroSciences B.V.
Prins Boudewijnlaan 41
B2650 Edegem, België
Tel : 03 450 27 00
Fax : 03 457 07 73

P0001796415

200mm

187mm

LEDIGE VERPAKKING EN SPUITOVERSCHOTTEN

De ledige verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden door middel van een manueel systeem (3 opeenvolgende malen schudden met water) of door middel van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoverschotten minstens 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen, beken en grachten noch met het middel, noch met de verpakking vervuilen. De verpakking in geen geval herbruiken voor een ander doel. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

WERKINGSSPECTRUM

AZ is enkel werkzaam tegen kiemende breedbladige onkruiden. Bestaande onkruiden worden niet bestreden.
AZ bestrijdt geen grassen.
AZ blijft gemiddeld 2 tot 6 maanden actief in de bodem.

Zeer gevoelig

akkervioolt je	kamille	spurrie
brandnetels	klein kruiskruid	varkensgras
dovenetels	liggende vetmuur	waterpostelein
ereprijs	perzikkruid	zwaluwtong

Gevoelig
muur

Weinig gevoelig

meerjarige planten	paardenstaart
ontwikkelde onkruiden	wilgenroosje

HOE GEBRUIKEN

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. De dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (zoals het FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

1 - ERKENDE TEELTEN

In wintergranen : tarwe, gerst, spelt, triticale
In grasland-weiland, gazon, grasvelden
In sierbomen en -heesters
In kwekerijen van fruitbomen en struiken
In boomgaarden van appel- & perenbomen
In bollen, knollen of rhizomen van sierplanten
In aardbei
In cichorei & witloofwortelteelt
In valeriaan
In uien & sjalot
In rabarber
De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

2-1 - DOSERING EN TIJDSTIP VAN TOEPASSING IN GRANEN

SPUITVOLUME
AZ kan toegepast worden bij laag spuitvolume (100 à 150 L water/ha) of bij normaal spuitvolume (200 à 500 L/ha).
AZ wordt toegepast ofwel alleen, ofwel in mengsel met een antigrassenmiddel, ofwel in een onkruidbestrijdingsprogramma.

Algemene dosis
AZ 0.15 à 0.20 L/ha in vooropkomst en tot eerste bladstadium (BBCH 01).

Wintergerst
In vooropkomst of in vroege naopkomst in de herfst op jonge onkruiden bij voorkeur in het kiemlobstadium om het werkingsspectrum van ureumverbindingen te vervolledigen (zie werkingsspectrum).

Wintertarwe
In vooropkomst of in naopkomst in de lente op jonge onkruiden bij voorkeur in het kiemlobstadium om het werkingsspectrum van ureumverbindingen te vervolledigen (zie werkingsspectrum).

Triticale & spelt
In vooropkomst of in naopkomst op jonge onkruiden bij voorkeur in het kiemlobstadium om het werkingsspectrum van ureumverbindingen te vervolledigen (zie werkingsspectrum).

2-2 - DOSERING EN TIJDSTIP VAN TOEPASSING IN GRASSEN, grasvelden, weilanden, gazons

Aanleg van een nieuwe, tijdelijke of permanente weide, een grasveld of een gazon
Vanaf de vooropkomst t/m eerste bladstadium :
AZ 0.1 L/ha.
AZ bestrijdt de meeste breedbladige onkruiden (zie werkingsspectrum). AZ is enkel actief bij voldoende bodemvocht.
Deze behandeling kan in het stadium "uitstoeling" aangevuld worden met een herbicide dat het werkingspectrum van AZ vervolledigd.

2-3 - DOSERING EN TIJDSTIP VAN TOEPASSING IN SIERBOMEN EN -HEESTERS BOOMGAARDEN

In sierbomen en -heesters
In kwekerijen van fruitbomen en struiken
In boomgaarden van appel- & perenbomen
Dosis
AZ 0.5 à 1 L + aangepast herbicide
(bv : propyzamide 1 kg as/ha)
AZ spuiten vanaf december tot begin maart. AZ wordt op naakte bodem gespoten vóór de opkomst van de onkruiden.
De temperatuur beïnvloedt de werking van AZ niet. AZ kan perfect toegepast worden op een bevrozen bodem.

200mm

187mm

Een vochtige of natte grond is zeer gunstig voor AZ.
AZ is perfect selectief op ingewortelde planten. Op zaaibedden mag AZ niet toegepast worden.

2-4 - DOSERING EN TIJDSTIP VAN TOEPASSING IN AARDBEIEN

AZ wordt toegepast op een naakte bodem. Neerslag gedurende of na toepassing verbetert het resultaat. AZ is zeer veilig voor aardbeiplanten. AZ mag niet gespoten worden op "FRIGO-PLANTEN" alvorens deze de groei hebben hervat. Geen AZ toepassen op vermeerderingsvelden.
Dosis: 0 tot 10 dagen na het verplanten :
AZ 0.3 à 0.4 L/ha.

2-5 - DOSERING EN TIJDSTIP VAN TOEPASSING IN CICHOREI & WITLOOFWORTELTEELT

Te behandelen vanaf het stadium 4 bladeren tot 6 bladeren.
Dosis: **AZ 0.2 L/ha**
in één of twee toepassingen vanaf het moment dat 50% van de witloofplanten het 4 bladstadium bereikt hebben.

SAMENVATTING VAN HET KLASSIEKE PROGRAMMA

Vóór het zaaien inwerken	Vooropkomst	Naopkomst 4/6 bladstadium
BONALAN 9L	KERB 1 kg +ASULAM 1 à 2 L +LEGURAME 3 L	AZ 200 mL

MINI-DOSIS
In een mini-dosis programma & het gebruik van menging van herbiciden in naopkomst kunnen de vermelde dosissen verlaagd worden in functie van het stadium van de cichorei & van de onkruiden onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
In een dergelijk systeem is het mogelijk, vanaf het kiemlobstadium van de cichorei in een veld met 6 of meer cichorei per lopende meter, AZ te mengen met KERB + carbetamide + triflusulfuron-methyl.

2-6 - DOSERING EN TIJDSTIP VAN TOEPASSING IN VALERIAAN

Na het verplanten
Dosis: AZ 2 mL/are + propyzamide 5 g ws/are of AZ 0.2 L/ha + propyzamide 0,5 kg ws/ha

2-7 – DOSERING EN TIJDSTIP VAN TOEPASSING IN UIEN & SJALOT

Na het uitplanten
In na-opkomst vanaf het kiemhaakstadium
(2 bladstadium)
Dosis: AZ 0.2L/ha
Binnen de maand 1 maal herhalen (indien nodig)

2-8 - DOSERING EN TIJDSTIP VAN TOEPASSING IN BOLLEN, KNOLLEN OF RHIZOMEN VAN SIERPLANTEN

Kort na het uitplanten
Dosis: AZ 0.2 L/ha
gevolgd door bentazon 350 g ws/ha bij de eerste kiemende onkruiden.

2-9 - DOSERING EN TIJDSTIP VAN TOEPASSING IN RABARBER

Tijdens de vegetatieve rustperiode.
Dosis: AZ 0.4L/ha

3 - WEERSOMSTANDIGHEDEN

De werkzaamheid van AZ is afhankelijk van de neerslag na de behandeling. Het resultaat kan tegenvallen in het geval van een gebrek aan water. AZ moet toegepast worden vóór het kiemen van de onkruiden. AZ werkt meer dan 2 maanden na in de bodem. AZ is enkel actief tegen kiemende breedbladige onkruiden. De temperatuur speelt geen enkele rol. Een bevrozen grond is geen probleem. Een vochtige tot zeer vochtige bodem is perfect. De herfst- en winterperiode is het ideale toepassingstijdstip voor AZ.

4 - VOLGTEELTEN

In geval van gewasschade, kan men in de lente zonder risico eender welk grasachtig gewas herinzaaien : raaigras, granen, maïs, veldbeem, zwenkgras, ... Alvorens kruisbloemigen (koolgewassen, bladramenas, koolzaad, raap) of composiete teelten (cichorei, sla) of phacelia te zaaien op een veld behandeld met AZ dient men 12 maanden te wachten en daarna diep te ploegen (25 cm).

LEGURAME, registered trademark for carbetamide of BELCHIM-FEINCHEMIE.

5 - VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

S2	Buiten bereik van kinderen bewaren.
S13	Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
S20/21	Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
S23	Spuitnevel niet inademen.
S24	Aanraking met de huid vermijden.
S35	Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
S37	Draag geschikte handschoenen.
S61	Voorkom lozing in het milieu.
SP1	Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

EERSTE HULPMAATREGELEN

Geen drinken geven of braken opwekken, als het slachtoffer bewusteloos is.

Inslikken:
Spoel de mond. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking.

Contact met de ogen:
Spoel onmiddellijk met water gedurende tenminste 5 minuten.

Huidcontact:
Grondig wassen met water en zeep.

Inademen:
Naar de frisse lucht vervoeren. Raadpleeg een arts.

Aanwijzing voor de arts:
Daar er tot op heden enkel gegevens uit dierenexperimenten voorhanden zijn en geen of zeer weinig gevallen gerapporteerd zijn bij de mens, wordt een observatie in het ziekenhuis aangeraden bij significante inname.

200mm

187mm

EMBALLAGE VIDE ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage vide de ce produit doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur au point de ramassage prévu à cet effet.

Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fosses avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

SPECTRE D'ACTIVITE

AZ n'est actif que contre les dicotylées annuelles avant ou lors de leur germination. Il n'est actif que contre la semence.
AZ ne possède aucune action antigraminée.
AZ reste actif dans le sol pendant 2 à 6 mois en moyenne.

Espèces très sensibles

lamiers	pourpier	sagine
matricaire	renouée des oiseaux	séneçon
ortie de semis	renouée liseron	spergule
pensée des champs	renouée persicaire	véroniques (toutes)

Espèces sensibles

mouron des oiseaux

Espèces peu sensibles

épilobe	plantes vivaces
plantes déjà développées	prêle

MODE D'EMPLOI

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les programmes de désherbage par mini-doses (comme le système FAR en betteraves). La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'application, ni la réduction du délai avant récolte.

1 - CULTURES AGREEES

En céréales d'hiver : froment, escourgeon, triticale, épeautre
En prairie, gazon, graminées
En arbres et arbustes ornementaux
En pépinière d'arbres fruitiers & espèces buissonantes
En verger de pommier & poirier
En bulbes, tubercules ou rhizomes de plantes ornementales
En fraisier
En chicorée et endive
En valériane
En oignon & échalote
En rhubarbe
Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptible d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'agréation.

2-1 - DOSES ET STADES D'APPLICATION EN CEREALES

VOLUME DE BOUILLIE

AZ peut être pulvérisé à volume réduit (100 à 150 L d'eau/ha) ou à volume moyen (200 à 500 L/ha).
AZ s'utilise soit seul, soit en mélange extemporané avec un herbicide antigraminée, soit en séquence dans un programme herbicide.

Dose générale

AZ 0.15 à 0.20 L/ha en préémergence & jusqu'au stade 1 feuille (BBCH 01).

Escourgeon & orge d'hiver

En préémergence ou en postémergence précoce en automne sur des dicots au stade cotylédonnaire pour compléter le spectre d'action des urées substituées (voir spectre d'action).

Froment

En préémergence ou en postémergence précoce au printemps sur des dicots au stade cotylédonnaire pour compléter le spectre d'action des urées substituées (voir spectre d'action).

Triticale & épeautre

En préémergence ou en postémergence précoce sur des dicots au stade cotylédonnaire pour compléter le spectre d'action des urées substituées (voir spectre d'action).

2-2 - DOSES ET STADES D'APPLICATION EN GRAMINEES terrain de sport, prairie, gazon

Semis d'une nouvelle prairie temporaire ou définitive, un terrain de sport, ou d'un gazon
En préémergence et jusqu'au stade 1 feuille :
AZ 0.1 L/ha.
AZ contrôle les dicotylées sensibles (voir spectre d'action). Il n'est actif que sur sol humide.
Cette application peut être suivie au tallage par un herbicide qui complète le spectre d'efficacité d' AZ.

2-3 - DOSES ET STADES D'APPLICATION EN ARBRES ET ARBUSTES ORNEMENTAUX & VERGER

En arbres et arbustes ornementaux
En pépinière d'arbres fruitiers & espèces buissonantes
En verger de pommier & poirier
Dose
AZ 0.5 à 1 L + herbicide adapté
(par ex. : propyzamide 1 kg ma/ha)
Pulvériser AZ à partir de décembre & jusqu'en mars sur sol propre en préémergence des malherbes.
La température n'influence pas l' efficacité du traitement.
AZ peut être appliqué sur sol gelé. AZ aime les sols humides & les températures basses. La sélectivité de l' AZ est absolue sur des plantes enracinées. AZ ne peut pas être appliqué sur des semis.

187mm

2-4 - DOSES ET STADES D'APPLICATION EN FRAISIER

AZ s'applique sur sol nu et si possible en période pluvieuse. AZ ne peut pas être appliqué sur "plants frigo" avant que la croissance de ces plants n'ait repris. Ne pas utiliser AZ sur les champs de multiplication des stolons.
Dose: 0 à 21 jours après la plantation : AZ 0.3 à 0.4 L/ha.

2-5 - DOSES ET STADES D'APPLICATION EN ENDIVE & CHICOREE

A appliquer à partir du stade 4 feuilles jusqu'au stade 6 feuilles.
Dose: **AZ 0.2 L/ha**
en une ou deux applications dès que 50% des chicorées ont atteint le stade 4 feuilles.

2-6 - DOSES ET STADES D'APPLICATION EN VALERIANE

Après repiquage des plants.
Dose: AZ 2 mL/are + propyzamide 5 g ma/are ou AZ 0.2 L/ha + propyzamide 0,5 kg ma/ha

2-7 – DOSES ET STADES D'APPLICATION EN OIGNON & ECHALOTE

Après repiquage des plants.
En postémergence à partir du stade crosse (2 feuilles)
Dose: AZ 0.2L/ha
Ce traitement peut être répété dans les 30 jours (si nécessaire)

RESUME PROGRAMME CLASSIQUE

Herbicides de présemis	Herbicides de préémergence	Herbicide de postémergence 4/6 feuilles
BONALAN 9 L	KERB 1 kg +ASULAM 1 à 2 L +LEGURAME 3 L	AZ 200 mL

MINI-DOSES
Dans le cadre d'un programme MINI-DOSES, il est possible en postémergence de réaliser un mélange d'herbicides à dose très réduite sous la totale responsabilité de l'utilisateur.
Dans ce cas, à partir du stade cotylédon de la chicorée & dés que 6 chicorées ou plus sont visibles par metre courant, il sera conseillé de mélanger AZ + KERB + carbetamide + triflusulfuron-methyl.

2-8 - DOSES ET STADES D'APPLICATION EN BULBES, TUBERCULES OU RHIZOMES DE PLANTES ORNEMENTALES

Juste après repiquage des plants.
Dose: AZ 0.2 L/ha
suivi de bentazone 350 g ma/ha dès l'apparition des premières malherbes restantes.

2-9 - DOSES ET STADES D'APPLICATION EN RHUBARBE

Pendant la période de repos végétatif
Dose: AZ 0.4L/ha

3 - CONDITIONS CLIMATIQUES

L'efficacité d' AZ est influencée par la pluviosité qui suit le traitement et le résultat herbicide peut être insatisfaisant en cas de déficit en eau. AZ s'applique sur sol nu avant l'émergence des adventices. AZ persiste plus de 2 mois dans le sol. AZ est actif sur les dicotylées en germination. Il faut appliquer AZ avant la levée des malherbes pour obtenir un résultat fiable. La température ne joue aucun rôle. Un sol gelé convient parfaitement. Un sol humide à très humide est parfait. Automne & hiver sont les saisons préférées de AZ.

4 - CULTURES SUIVANTES

En cas de destruction accidentelle de la culture traitée avec AZ, il est possible de ressemer au printemps n'importe quelle graminée sans aucune précaution : céréales, maïs, ray-grass, fétuque, pâturin des prés, ... Avant de ressemer une crucifère (colza, choux, radis, navet,...), une composée (chicorée, salade) ou une phacelia, il faut attendre 12 mois et effectuer un labour profond (25 cm).

LEGURAME, registered trademark for carbetamide of BELCHIM-FEINCHEMIE.

5 - CONSEILS DE PRUDENCE

S2	Conserver hors de la portée des enfants.
S13	Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
S20/21	Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'utilisation.
S23	Ne pas respirer les brouillards de pulvérisation.
S24	Eviter le contact avec la peau.
S35	Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.
S37	Porter des gants appropriés.
S61	Eviter le rejet dans l'environnement.
SP1	Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

PREMIERS SECOURS

Ne jamais faire boire ou faire vomir si le patient est inconscient ou a des convulsions.
Ingestion:
Rincer la bouche. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.
Contact avec les yeux:
Rincer immédiatement à l'eau pendant au moins 5 minutes.
Contact avec la peau:
Laver minutieusement au savon et à l'eau.
Inhalation:
Emmener à l'air frais. Consulter un médecin.
Note au médecin :
Etant donné que seules des données sur les animaux d'expérimentations sont disponibles et pas ou peu de cas d'intoxication sont rapportés chez l'homme, une observation en milieu hospitalier est conseillée chez une ingestion significante.

200mm

187mm

Dow AgroSciences

AZ* 500

HERBICIDE

HERBICIDE ANTIDICOTYLÉES DE PRÉÉMERGENCE OU DE POSTÉMERGENCE PRÉCOCE EN CÉRÉALES D'HIVER (FROMENT, ESCOURGEON, TRITICALE, ÉPEAUTRE), EN PRAIRIE, GRAMINÉES, EN ARBRES ET ARBUSTES ORNEMENTAUX, EN VERGER DE POMMIER & POIRIER, EN FRAISIER & EN BULBES, TUBERCULES OU RHIZOMES DE PLANTES ORNEMENTALES. HERBICIDE DE POSTÉMERGENCE EN CHICORÉE, ENDIVE, VALÉRIANE, OIGNON, ÉCHALOTE, RHUBARBE.

HERBICIDE TEGEN DICOTYLEN IN WINTERGRANEN, TOE TE PASSEN IN VOOROPKOMST OF IN WINTERGRANEN (TARWE, GERST, SPELT, TRITICALE), IN WEILANDEN, GAZON, GRASVELDEN, IN SIERBOMEN EN -HEESTERS, IN BOOMGAARDEN (APPEL- & PERELAARS), IN AARDBEI, IN BOLLEN, KNOLLEN OF RHIZOMEN VAN SIERPLANTEN. HERBICIDE IN CICHOREI, WITLOOFWORTELTEELT, VALERIAAN, UIEN, SJALOT, RABARBER, TOE TE PASSEN IN NAOPKOMST.

CRAINT LE GEL / SECOUER AVANT L'EMPLOI
VORSTVRIJ BEWAREN / SCHUDDEN VOOR GEBRUIK

Contient : SC-suspension concentrée à base de 500 g/L d'isoxaben ou 45,4%
Bevat : SC-suspensieconcentraat op basis van 500 g/L isoxaben of 45,4%
Numéro d'agréation/Erkenningsnummer : 7573/B
Numéro d'agrément : L 1149-66
N° de lot : voir sur le flacon
Partijnummer : zie op de bus
*AZ trademark of Dow AgroSciences LLC

NATURE DES RISQUES PARTICULIERS

R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R53 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

GARANTIE

Le fabricant n'est pas responsable des risques de stockage, de la manipulation ou de l'efficacité de AZ* puisqu'il n'a aucun contrôle sur ceux-ci. Le fabricant garantit exclusivement la composition et le contrôle de qualité du produit qui est légalement autorisé à la vente et qui correspond à la formule mentionnée sur l' étiquette.

CENTRE ANTIPOISONS : 070/245.245.

irritant/irriterend

Volg de bijgevoegde gebruiksaanwijzing om gevaar aan mens en dier te voorkomen.
Respecter les instructions d'utilisation, ci-jointes, pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.

AARD VAN DE BIJZONDERE GEVAREN

R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R53 Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

WAARBORG

De fabrikant is niet aansprakelijk voor risico's die voortvloeien uit het opslaan, gebruik en verwerken van AZ*, aangezien deze buiten zijn controle liggen. De fabrikant garandeert uitsluitend de samenstelling en de kwaliteit van het product dat wettelijk is toegelaten en overeenstemt met de formulering vermeld op het etiket.

ANTIGIFCENTRUM : 070/245.245.

0,5 L ℮ PET

Dow AgroSciences B.V.
Prins Boudewijnlaan 41
B2650 Edegem, België
Tel : 03 450 27 00
Fax : 03 457 07 73